

Dr. Sebastian Thüroff Parodontologie
Dr. Wolfgang Stoll Implantologie
Dr. Uta Stoll Ästhetische Zahnheilkunde
Endodontie
Prophylaxe

Allgemein

Sie sollten am Tag des operativen Eingriffes:

- nicht mehr Rauchen
- keinen Alkohol, Kaffee oder schwarzen Tee trinken (erhöhtes Risiko einer Nachblutung)
- nach der Anästhesie nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen
- die behandelte Region kühlen (Gel-Kompresse oder kalter Waschlappen, KEIN EIS)

Einnahme von Ibuprofen

- 1 Tablette unmittelbar nach der Operation
 - 1 Tablette vor dem Schlafen gehen
 - 1 Tablette am nächsten Morgen
- weitere Tabletten nach Bedarf
(anhaltende Schmerzen oder Schwellung)

Curasept Mundspülung

- am Tag der Operation abends mit der gebrauchsfertigen Lösung den Mund vorsichtig ausspülen
- danach 3x täglich ausspülen

Nach Implantationen

Bei Patienten mit herausnehmbarem Zahnersatz:

- der Ersatz dient in der frühen Einheilungsphase der Implantate (ca. 10 Tage) ausschließlich dem Erhalt des optischen Erscheinungsbildes sowie der Sprachbildung. Das bedeutet, dass der Ersatz so oft wie möglich herausgenommen werden soll, um die optimale Einheilung der Implantate nicht zu gefährden.
- damit eine Überbelastung der Implantate vermieden wird, darf der Ersatz weder zum Essen noch zum Schlafen getragen werden.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung und einen komplikationslosen Heilungsverlauf.